偏微分方程式の解法

移流方程式の差分化

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} + c \frac{\partial u(x,t)}{\partial x} = 0, \quad u(x,t=0) = f(x) \quad \text{を数値的に解く。}$$

解は $u(x,t) = f(x - ct)$

差分化すると
$$\frac{u(x,t + \Delta t) - u(x,t)}{\Delta t} + c \frac{u(x,t) - u(x - \Delta x)}{\Delta x} = 0$$

これを格子点上で解いていく

偏微分方程式の解法

移流方程式の差分化

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + c \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = 0 \quad \longrightarrow \quad u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{c\Delta t}{\Delta x} (u_j^n - u_{j-1}^n)$$

左から右へ、順番に値が決まっていく。
(左からくる)情報が(右へ)伝播していく。

ノイマンの安定性解析

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + c \frac{u_j^n - u_{j-1}^n}{\Delta x} = 0$$

の1つの特解として $u_j^n = g^n \exp[i\theta j\Delta x]$ を考える。

$$u_j^{n+1} = g^{n+1} \exp[i\theta j\Delta x] = g u_j^n$$

$$u_{j-1}^n = g^n \exp[i\theta(j-1)\Delta x] = u_j^n \exp[-i\theta\Delta x] \quad \text{から}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{c\Delta t}{\Delta x} (u_j^n - u_{j-1}^n) \longrightarrow g u_j^{n+1} = u_j^n \left(1 - \frac{c\Delta t}{\Delta x} (1 - \exp[-i\theta\Delta x]) \right)$$

$$g = 1 - \frac{c\Delta t}{\Delta x} (1 - \exp[-i\theta\Delta x])$$

$\frac{c\Delta t}{\Delta x} > 1$ の時には $|g| > 1$ で、解が発散する。(不安定)

CFL条件

前の解析から $\frac{c\Delta t}{\Delta x} < 1$ が安定に解くための必要条件であることがわかる。

ノイマンの安定性解析： 別の例

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} + c \frac{u_{j+1}^n - u_{j-1}^n}{2\Delta x} = 0 \quad \text{空間微分を中心差分にする。}$$

$$u_j^{n+1} = g^{n+1} \exp[i\theta j\Delta x] = g u_j^n$$

$$u_{j-1}^n = g^n \exp[i\theta(j-1)\Delta x] = u_j^n \exp[-i\theta\Delta x]$$

から

$$u_{j+1}^n = g^n \exp[i\theta(j+1)\Delta x] = u_j^n \exp[+i\theta\Delta x]$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{c\Delta t}{2\Delta x} (u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) \longrightarrow g u_j^{n+1} = u_j^n \left(1 - \frac{c\Delta t}{2\Delta x} (\exp[i\theta\Delta x] - \exp[-i\theta\Delta x]) \right)$$

$$g = 1 + i \frac{c\Delta t}{\Delta x} \sin(\theta\Delta x), \quad |g| = \left(1 + \left(\frac{c\Delta t}{\Delta x} \right)^2 \sin^2(\theta\Delta x) \right)^{1/2} > 1$$

$\frac{c\Delta t}{\Delta x}$ によらず常に解が発散する。(不安定)